

GEMIDDELD VERLOOP BIJ EERSTE SCABIËSINFECTIE

Besmetting bij frequent en/of intensief huidcontact (>15 min):

- via direct huidcontact
- via mogelijk besmet materiaal (= alle stoffen materiaal dat intensief met de huid in contact kwam)

Week 1 Incubatie	Vanaf week 2 Start besmettelijke periode	Vanaf voltooiën behandeling Geen besmettingsrisico
	Vanaf week 7 Start symptomen	

BEHANDELING VAN SCABIËS BESTAAT UIT TWEE DELEN

Medicamenteuze behandeling	Hygiënemaatregelen
• Klachten behandelen • Verspreiding voorkomen	• Herbesmetting voorkomen • Verspreiding voorkomen

Medicamenteuze behandeling

	Benzylbenzooat (25%, lokaal)	Permethrine (5%, lokaal)	Ivermectine (0,2 mg/kg, oraal)	Ivermectine (1%, lokaal)
Wanneer	dag 1, dag 2, dag 3	dag 1, dag 8	dag 1, dag 8	dag 1, dag 8
Applicatieduur	24 uur	12 uur	Orale inname	8 uur
Tijdstip van toediening	Ochtend	Voor slapen	Voor slapen (buiten maaltijd)	Voor slapen
Bijwerkingen	Onaangename geur, huidirritatie, allergische huidreacties	(Erythemateuze) huiduitslag, droge huid, paresthesie en branderig gevoel	GI-klachten, hoofd-, spier- en gewrichtspijn. Zelden: encefalitis, SJS	Huidirritatie
Volw. en kind >15 kg	+	+	+	+
Kind ≤15 kg en >2 maanden	+	+	-	-
Kind ≤2 maanden	+	-	-	-
Zwangerschap	+ (geen absorptie)	+ (wel absorptie)	-	-
Borstvoeding	+	+	+ (24 uur afkolven)	?

+: veilig gebruik; -: contra-indicatie; kg: kg lichaamsgewicht; volw.: volwassene; GI: gastro-intestinale; SJS: Stevens Johnsonsyndroom

Hygiënemaatregelen

- Vermijd direct huidcontact (tot medicamenteuze behandeling is voltooid) met index en nauwe contacten.
- Mogelijk besmet materiaal:
 - Zorg dat dit gedurende 3 dagen niet met de huid in contact komt OF was dit via een volledig wasprogramma van 50°C of meer.
 - Doe dit bij begin behandeling (dag 1, dag 8) voor materiaal van 3 voorafgaande dagen EN bij einde behandeldag(en) voor materiaal van tijdens de behandeldag(en)

