

ANAMNESE


- **Jeuk:** veralgemeende jeuk die vooral 's nachts erger is
 - algemene bevolking: 2-6 weken na infectie
 - kwetsbare personen (verminderde immuniteit): 10 weken na infectie
- **Nauwe contacten met jeukklachten**

KLINISCH ONDERZOEK

- Voer klinisch onderzoek uit in een goed verlichte ruimte op een zo groot mogelijke huidoppervlakte.
- Zoek scabiësgangetjes op typische plaatsen (tussen vingers, tenen en buigzijde van pols).


KINDEREN <2 JAAR

- **Typische letsels:** vesikels en pustels (minstens 3 per lichaamsdeel).
- **Letsels ter hoogte van de hoofdhuid** algemeen voorkomend.



KINDEREN >2 JAAR EN VOLWASSENEN

- **Typische letsels:** solide, verheven papels (2-3 mm) en grotere nodulaire letsels (5-10 mm) (minstens 3 per lichaamsdeel; typisch ter hoogte van mannelijke genitaliën).
- **Letsels ter hoogte van de hoofdhuid en atypische letsels** enkel bij immuungecompromitteerde patiënten en kwetsbare ouderen (multimorbiditeit en 'frailty').



ZEKERHEIDSGRAAD

ZEKER

- aangetoonde scabiësmijt met dermatoscoop

WAARSCHIJNLIJK

- scabiësgangetjes
of
- papels of noduli ter hoogte van mannelijke genitaliën
of
- jeuk + typische letsels + typische plaatsen + nauw contact met jeuk of met typische letsels

VERMOEDELIJK

- jeuk + typische letsels + typische plaatsen
of
- typische letsels + typische plaatsen + nauw contact met jeuk of met typische letsels
of
- jeuk + atypische letsels/plaatsen + nauw contact met jeuk of met typische letsels

DIFFERENTIËLE DIAGNOSE

- (pre)bulleus pemfigoïd
- eczeem (atopisch, contact, seborroïsch)
- folliculitis impetigo
- insectenbeten
- jeuk en huidafwijkingen als bijwerking van bestaande behandeling
- lichen planus
- pityriasis rosea
- prurigo
- psoriasis
- seniele pruritus
- urticariële dermatitis